Zopiclon kaufen online

Zopiclon (imovane) 7.5 mg online kaufen ohne rezept Deutschland

Das Präparat Imovane in der Dosierung von 7,5 mg enthält Zopiclon als Wirkstoff. Diese chemische Verbindung wird vorwiegend der Gruppe der Sedativa und Hypnotika (Schlafmittel) zugeordnet. Es handelt sich um einen Nicht-Benzodiazepin-Wirkstoff, dessen molekulare Struktur als Cyclopyrrolon-Derivat definiert ist und der zur Kategorie der sogenannten Z-Substanzen gehört. Zopiclon ist eine vollsynthetische Substanz, die durch chemische Synthese hergestellt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sedativa beeinflusst Zopiclon spezifisch den Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieses Schlafmittel wird zur streng kontrollierten Behandlung von Insomnie eingesetzt und soll das Einschlafen erleichtern. Von seiner Wirkweise her ist das Präparat mit anderen Nicht-Benzodiazepinen, wie etwa Zolpidem, verwandt. Sie wirken modulierend auf die Aktivität der Großhirnrinde, um die Nachtruhe bei Erwachsenen mit Einschlafstörungen zu normalisieren.

Zopiclon wird üblicherweise zur symptomatischen Behandlung von Insomnie bei Erwachsenen eingesetzt, insbesondere wenn die Schlafstörung zu erheblichen funktionellen Beeinträchtigungen führt oder den Alltag stark beeinträchtigt.

Symptomatische Linderung von Schlafstörungen

Imovane wird typischerweise zur Behandlung zweier Aspekte der Insomnie eingesetzt: Einschlafstörungen (Verlängerung der Einschlaflatenz) und Durchschlafstörungen, einschließlich nächtlichen Erwachens oder zu frühen Aufwachens am Morgen. Die Verschreibung ist bei einem leichten oder instabilen Krankheitsverlauf angezeigt, der durch Phasen der Verschlechterung und Veränderungen des Krankheitsbildes gekennzeichnet ist. Das Präparat kommt zum Einsatz, wenn akute Symptome gelindert werden müssen, insbesondere bei vorübergehender, stark ausgeprägter Insomnie.

Seine unterstützende Wirkung hilft, die Symptomlast in Phasen vorübergehend verstärkter Schlafstörungen zu reduzieren. Eine solche Unterstützung ermöglicht es den Betroffenen, eine dauerhafte Besserung zu erzielen, schneller einzuschlafen, die Therapiedauer zu verlängern und die Qualität der Nachtruhe zu steigern. Dadurch bleibt die Leistungsfähigkeit erhalten, was es ermöglicht, die alltäglichen Aufgaben trotz der auftretenden Symptome der Störung zu bewältigen.